



Bio-Legehennenfutter - Phase 1

Für die Phase, in der die Produktion weiterläuft, die Herde aber zu altern beginnt. Unter Berücksichtigung des sich ändernden Nährstoffbedarfs sollen die Produktion aufrechterhalten, die Schalenqualität bewahrt und die Kondition der Herde unterstützt werden.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	15,5–17	%
Umsetzbare Energie (ME)	2700–2840	kcal/kg
Rohfett	3–5	%
Rohfaser	3,5–5,5	%
Rohasche	13–16	%
Calcium (Ca)	4–4,6	%
Phosphor (P)	0,5–0,62	%
Natrium (Na)	0,16–0,19	%



PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform



VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose



HERKUNFT
Türkei



Ausgewogene Fütterung bei fortlaufender Produktion

Der Zeitraum von 46 bis 65 Wochen ist die Phase, in der die Herde von der Hochleistungsphase in einen späteren Produktionsabschnitt übergeht. Während sich die Legeleistung im Laufe der Zeit verändert, unterscheidet sich auch der Nährstoffbedarf der Henne je nach Produktionsniveau und Körperzustand.

Bioyem Bio-Legehennenfutter Phase 1 ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Legehennen im Alter von 46–65 Wochen in diesem Produktionsabschnitt.

In dieser Phase ist es wichtig, das Fütterungsprogramm nicht nur nach der Anzahl der Eier zu steuern, sondern Eigewicht, Schalenqualität, Kondition der Herde und die gesamte Produktionsleistung gemeinsam zu betrachten.

Insbesondere die Erhaltung der Körperreserven und der Mineralstoffbilanz des Tieres bei gleichzeitiger Unterstützung einer kontinuierlichen Eiproduktion ist für die langfristige Herdenleistung wichtig.

Die Phase 1 ermöglicht nach der Spitzenleistung den Übergang zu einem Fütterungsprogramm, das zum veränderten Bedarf der Herde passt.



EINSATZZEITRAUM
46–65 Wochen



ZIELTIER
Legehennen in Phase 1



PRODUKTTYPE
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.