



Bio-Legehennenfutter - Phase 2

Für den sich ändernden Nährstoffbedarf älterer Legehennen. Unter Berücksichtigung des mit dem Alter veränderten Produktionsniveaus und der Futteraufnahme wird es eingesetzt, um die fortgesetzte Produktion, die Schalenqualität und die allgemeine Kondition der Herde zu unterstützen.

Analytische Bestandteile

PARAMETER	WERT	EINHEIT
Rohprotein	14,5–16	%
Umsetzbare Energie (ME)	2650–2750	kcal/kg
Rohfett	2,5–4,5	%
Rohfaser	4–6	%
Rohasche	13–16,5	%
Calcium (Ca)	4,2–4,8	%
Phosphor (P)	0,45–0,58	%
Natrium (Na)	0,16–0,19	%



PRODUKTFORM
Mischfutter in Mehlform



VERPACKUNG
25-kg-PP-Sack · 50-kg-PP-Sack · 25-kg-Kraftpapiersack · 1.000-kg-Big-Bag · Lose



HERKUNFT
Türkei



Nachhaltige Fütterung in der späten Produktionsphase

Ab der 66. Woche treten die Hennen in einen späteren Abschnitt der Eiproduktion ein. In dieser Phase können sich Produktionsniveau, Eiqualität, Körperkondition und Mineralstoffbedarf von den vorherigen Phasen unterscheiden.

Bioyem Bio-Legehennenfutter Phase 2 ist ein Bio-Mischfutter für den Nährstoffbedarf von Legehennen, die ab der 66. Woche weiter produzieren.

Ziel ist in dieser Phase nicht nur, die Produktion aufrechtzuerhalten, sondern die vorhandene Kondition des Tieres zu bewahren und eine möglichst ausgewogene Fortsetzung der Eiproduktion zu unterstützen.

Mit zunehmendem Alter wird es wichtiger, Schalenqualität, Mineralstoffbilanz, Futteraufnahme und Körperkondition gemeinsam zu beobachten.

Deshalb sollte in der späten Produktionsphase statt eines einzigen Programms als Fortsetzung des bisherigen Futters ein Fütterungsprogramm eingesetzt werden, das zum veränderten Bedarf des Tieres passt.



EINSATZZEITRAUM
ab der 66. Woche



ZIELTIER
Legehennen in Phase 2



PRODUKTTYP
Bio-Mischfutter

Die oben genannten Parameter geben allgemein anerkannte Werte wieder und können chargenabhängig abweichen; verbindliche Werte werden auf Anfrage im Rahmen der jeweiligen Gespräche mitgeteilt.