

علف عضوي لأبقار الحليب - ذروة الإدرار

يُحضّر للفترة الأولى من الإدرار التي يبلغ فيها إنتاج الحليب أعلى مستوياته. ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى مع ارتفاع إنتاج الحليب، ودعم الأداء الإنتاجي للبقرة.

المكونات التحليلية

المعيار	القيمة	الوحدة
البروتين الخام	19-21	%
الطاقة القابلة للتمثيل الغذائي (ME)	2700-2800	kcal/kg
الدهن الخام	3-5.5	%
الألياف الخام	7-10	%
الرماد الخام	≤ 9	%
الكالسيوم (Ca)	1-1.3	%
الفوسفور (P)	0.5-0.65	%
الصوديوم (Na)	0.35-0.45	%



المنشأ
تركيا

التعبئة
كيس PP سعة 25 كغ · كيس PP سعة 50 كغ · كيس كرافت سعة 25 كغ · كيس كبير (big bag) سعة 1000 كغ · سائب

شكل المنتج
علف مركب على شكل مسحوق

التغذية المتوازنة التي يتطلبها إنتاج الحليب المرتفع

الأيام المئة الأولى من الإدرار هي الفترة التي يرتفع فيها إنتاج الحليب وتزداد فيها حاجة البقرة إلى العناصر الغذائية زيادة كبيرة. وفي هذه المرحلة يكتسب تلبية ما يحتاجه الحيوان من طاقة وعناصر غذائية لإنتاج الحليب بصورة كافية ومتوازنة أهمية للحفاظ على حالته العامة.

بصورة متوازنة أهمية لدعم حالة جسم الحيوان وأدائه العام إلى جانب إنتاج الحليب.

ويجب في فترة ذروة الإدرار إدارة برنامج التغذية لا وفق كمية الحليب اليومية فحسب، بل بتقييم استهلاك الحيوان للعلف وحالة جسمه وحالته الصحية العامة معًا.

علف Bioyem العضوي لذروة الإدرار علف مركب عضوي مُعدّ لتلبية الاحتياجات الغذائية للآبقار الحلوب في الفترة الأولى من الإدرار؛ وبوصفه علفًا مركبًا لا يحل محل العلف الخشن، بل يُستخدم معه في العليقة.

وينبغي في هذه الفترة إيلاء اهتمام خاص لاختلال توازن الطاقة الذي قد ينشأ بين إنتاج الحليب المرتفع واستهلاك العلف. ويكتسب توفير الأحماض الأمينية والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى، وفي مقدمتها الطاقة والبروتين،

نوع المنتج
علف مركب عضوي

الحيوان المستهدف
الآبقار الحلوب في فترة ذروة الإدرار

فترة الاستخدام
اليوم 100-0

تمثل المعايير المذكورة أعلاه قيمًا متعارفًا عليها وقد تتغير من دفعة إلى أخرى؛ أما القيم المُلزِمة فتُبلّغ عند الطلب خلال المحادثات التي تليه.